

Casoar à casque

Casuarius casuarius

Southern cassowary



Omnivore à tendance frugivore



1,50 à 1,80 m de haut



35 à 75 kg



jusqu'à 30 ans dans la nature



47 à 61 jours d'incubation, 3 à 8 oeufs par ponte




Forêts tropicales d'Océanie

Liens d'apparentement

Classe
Oiseaux

Ordre
Casuariiformes

Famille
Casuariidés



Conservation



Préoccupation mineure (LC)




Gestion en parc zoologique :

Programme de conservation européen

Des œufs de couleur vive

Solitaires, les casoars ont un mode de reproduction et d'élevage particuliers : après l'accouplement, le mâle creuse un trou dans le sol où la femelle pond en moyenne 4 œufs de couleur vert vif. Elle quitte ensuite le nid et laisse le mâle seul.

Ce dernier se charge de couvrir puis d'élever les petits pendant plusieurs mois. Très protecteur, le mâle est alors vigilant et bien plus agressif !



Le saviez-vous ?

Les casoars ne possèdent pas de bréchet sur leur sternum. C'est un os où se fixent des muscles puissants permettant de battre des ailes. Ces oiseaux ne peuvent donc pas voler. En revanche, ils peuvent courir jusqu'à 50 km/h à travers la forêt !